MEHILÄINEN

Miten tutkia ärsytysastmaepäilyä?

Työpaikalla on **altistumista** hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville aineille.

HTP-arvojen ylittyminen on mahdollista.

JA

Työntekijällä esiintyy **astmaoireita**, kuten yskä, hengenahdistus, rasituksen siedon aleneminen, hengityksen vinkunaa tai muusta syystä syntyy epäily uudesta astmasta.

Spirometria ja bronkodiltaatiokoe	PEF-vrk seuranta*	Thorax rtg**	(lab: crp, PVK, B-eos, NSOrtg**)

* PEF-työpaikkaseuranta ei kuulu ärsytysastman tutkimuksiin

** Arvioitava esiintyykö infektiota tai muuta syytä, joka selittäisi potilaan oireet

ESIINTYYKÖ JOKIN SEURAAVISTA LÖYDÖKSISTÄ?

A) Todetaan nykyisessä työssä kehittynyt astma

B) Astmaoireita liittyy työpäiviin, prosessipäästöihin tai muihin altistumistilanteisiin

C) FEV1 on alentunut aiemmasta merkittävästi (% viitearvosta -luku on pienentynyt vähintään 15 %)

D) Spirometriassa tai PEF-seurannassa on viitteellisiä muutoksia, vaikkei astmadiagnoosi vahvistu

KYLLÄ

AMMATTITAUTIEPÄILY VAHVISTUU

LÄHETE

Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteeseen tai alueelliselle työlääketieteen tai keuhkosairauksien poliklinikalle

EI MIKÄÄN

AMMATTITAUTIEPÄILY EI VAHVISTU

SEURANTA

työterveyshuollossa